Baliste clown ou léopard *Balistoides conspicillum*

Secteur : Océan indien
Pays : France
Région Mayotte
Lieu : Passe en S
Site : Pointe Barracuda
Profondeur :.20 m.
Date : 10 mai 2010
Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	*Nom latin*	*Nom en français et explications*
Règne	Animalia	Animal
Embranchement	Chordata	Cordé = Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés.
Sous-embranchement	Vertebrata	Vertébré = Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux
Super-classe	Osteichthyes	Osteichthyens : Vertébrés à squelette osseux.
Classe	Actinopterygii	Actinopterigiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées.
Sous-classe	Neopterygii teleostei	Néoptérygiens téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées
Super-ordre	Acanthopterygii	Acanthoptérygiens : Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens.
Ordre	Tetraodontiformes	Tetraodontiformes: Groupe hétérogène mais absence d'écailles imbriquées, ouvertures branchiales réduites, bouche très peu fendue, pelviennes anormales ou absentes.
Sous-ordre	Tetraodontoidei	Tetraodontoïdes : Mâchoires et dents transformées en "bec de perroquet"
Famille	Balistidae	Balistidés : La première épine de la première nageoire dorsale peut se bloquer en position verticale.
Genre	Balistoides	
Espèce	conspicillum	

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 15.06.2010