Etoile de mer verruqueuse

Echinaster callosus

Secteur : Mer de Chine
Pays : Philippines
Région : Ile de Mindoro
Lieu : Puerto Galero
Site : West Escarcero
Profondeur : 15 m.
Date : 2 mai 2011

Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	*Nom latin*	*Nom en français et explications*
Règne	Animalia	Animal
Embranchement	Echinodermata	Echinodermes : Symétrie radiale d'ordre cinq (chez les adultes). Squelette de plaques calcaires bien développé sous le derme. Présence d'un système aquifère auquel appartiennent les podias souvent visibles extérieurement.
Sous-embranchement	Eleutherozoa	Eleuthérozoaires : Echinodermes libres, mobiles, jamais fixés.
Super-classe	Asterozoa	Echinodermes : de forme étoilée. Les bras, simples et parfois absents, sont en nombre variable, et contiennent des organes.
Classe	Asteroidea	Astérides : Organismes en forme d'étoile, libres. 5 à 50 bras, squelette réduit, estomac dévaginable. Ce sont les étoiles de mer.
Ordre	Spinulosida	Spinulosides: Podia* avec ventouses. La surface aborale* porte de petites épines, plaque marginale et pédicellaires* absents.
Sous-ordre	Leptognathina	
Famille	Echinasteridae	Echinastéridés
Genre	Echinaster	
Espèce	callosus	

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 21.06.2011