# Poisson porc-épic à taches jaunes *Cyclichthys spilostylus*



*Secteur :* Mer Rouge
*Pays : Egypte*
*Région Egypte Sud*
*Lieu : St-John*
*Site :* Sha'ab Marsa Alam
*Profondeur :.15 m.*
*Date :* 28 avril 2006

*Photo* : Claude Cevey

| *Rang taxonomique* | *Nom latin* | *Nom en français et explications* |
|---|---|---|
| *Règne* | Animalia | Animal |
| *Embranchement* | Chordata | Cordé = Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |
| *Sous-embranchement* | Vertebrata | Vertébré = Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux |
| *Super-classe* | Osteichthyes | Osteichthyens : Vertébrés à squelette osseux. |
| *Classe* | Actinopterygii | Actinopterigiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées. |
| *Sous-classe* | Neopterygii teleostei | Néoptérygiens téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées |
| *Super-ordre* | Acanthopterygii | Acanthoptérygiens : Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens. |
| *Ordre* | Tetraodontiformes | Tetraodontiformes : Groupe hétérogène mais absence d'écailles imbriquées, ouvertures branchiales réduites, bouche très peu fendue, pelviennes anormales ou absentes. |
| *Famille* | Diodontidae | Diodontidés : poissons ayant la capacité de gonfler. Ils ont également des piquants ce qui les distingue des Tetraodontidae qui eux n'en ont pas. |
| *Genre* | Cyclichthys | |
| *Espèce* | spilostylus | |