Ver plat fuchsia *Pseuoiceros ferrugineus*

Secteur : Indonésie
Pays : Philippines
Région : Negros Oriental
Profondeur : 10 m

Taille adulte : 1.8 à 4.8 cm
Profondeur : 3 à 25 m.
Date : 18 février 2013
Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	Termes latin	Termes français et descriptif
Embranchement	*Platyhelminthes*	**Plathelminthes** :Vers plats à symétrie bilatérale, portant des organes des sens simples sur la tête, tube digestif à une seule ouverture ventrale. Nombreuses espèces libres ou parasites.
Classe	*Turbellaria*	**Turbellariés** : Vers plats libres (non parasites) mus par une ciliature ventrale. Tube digestif ramifié qui possède une seule ouverture au centre de la face ventrale.
Sous-classe	*Archoophora*	**Archoophores**
Ordre	*Polycladida*	**Polyclades** : Turbellariés à intestin très ramifié. Espèces de grande taille. Planaires marines.
Sous-ordre	*Cotylea*	**Cotylés** : Polyclades caractérisés par la présence d'une ventouse ventrale permettant aux vers de se maintenir sur le fond.
Famille	*Pseudocerotidae*	**Pseudocérotidés** : Corps ovale, lisse ou à papilles. Tentacules proéminents formés à partir de la marge.
Genre	*Pseudoceros*	
Espèce	*Ferrugineus*	