# *Crevette vir* — *Vir colemani*

*Secteur :* Mer de Chine
*Pays : Philippines*
*Région : Negros Oriental*
*Profondeur : 15 m.*
*Date :* 13 février 2013
*Photo : Claude Cevey*

*Au centre du corail, on distingue la crevette. Elle est légèrement rose*

| Rang taxonomique | *Nom Latin* | Nom français et explications |
|---|---|---|
| **Règne** | *Animalia* | Animal |
| **Embranchement** | *Arthropoda* | Arthropodes : Animaux dont le corps et les pattes sont segmentés. L'exosquelette dur est articulé. Les yeux sont composés et latéraux. |
| **Sous-embranchement** | *Crustacea* | Crustacés : Arthropodes principalement aquatiques pssédant deux paires d'antennes biramées, 2 paires de maxilles, des appendices biramés sur le tronc. |
| **Classe** | *Malacostraca* | Malacostracés : 8 segments thoraciques, 6 segments abdominaux. Appendices présents sur le thorax et l'abdomen. |
| **Sous-classe** | *Eumalacostraca* | Eumalacostracés : Présence d'une carapace recouvrant la tête et tout ou partie du thorax. |
| **Super-ordre** | *Eucarida* | Eucarides : Présence d'un rostre. |
| **Ordre** | *Decapoda* | Décapodes : La plupart marins et benthiques. Yeux composés pédonculés. Les segments thoraciques sont fusionnés avec la tête pour former le céphalothorax. La première paire de péréiopodes est transformée en pinces. Cinq paires d'appendices locomoteurs (pinces comprises). |
| **Sous-ordre** | Pleocyemata | Ploocyemates : Le terme pleocyemata est construit sur les deux éléments « pléo » mpour pour pléopode (appendice abdominal des crustacés) et « cyéma ». Ce groupe de crustacés décapodes incube ses œufs accrochés aux appendices abdominaux. C'est dans cete situation que se déroule l'embryogenèse et parfois l'ensemble du développement. Eclosion sos forme de larve zoé, ou plus avancée. |
| **Famille** | Palaemonidae | |
| **Genre** | Vir | |
| **Espèce** | colemani | |

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 26.05.13