# Poisson clown à 3 bandes

*Amphiprion ocellaris*



*Secteur :* Indonésie
*Pays : Philippines*
*Région : Negros Oriental*
*Profondeur : 15 m.*
*Date :* 19 février 2013
*Photo : Claude Cevey*

*En Thaïlande et en Australie il change de couleur*

| *Rang taxonomique* | *Nom latin* | *Nom en français et explications* |
|---|---|---|
| *Règne* | Animalia | Animal |
| *Embranchement* | Chordata | Cordé = Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |
| *Sous-embranchement* | Vertebrata | Vertébré = Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux |
| *Super-classe* | Osteichthyes | Osteichthyens : Vertébrés à squelette osseux. |
| *Classe* | Actinopterygii | Actinopterigiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées. |
| *Sous-classe* | Neopterygii teleostei | Néoptérygiens téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées |
| *Super-ordre* | Acanthopterygii | Acanthoptérygiens : Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens. |
| *Ordre* | Perciformes | Perciformes : Nageoires pelviennes très rapprochées des nageoires pectorales |
| *Sous-ordre* | Labroidei | Labroides : Une seule dorsale, dents molariformes formant un puissant appareil masticatoire |
| *Famille* | Pomacentridae | Pomacitrides |
| *Sous-famille* | Amphiprion | |
| *Genre* | ocellaris | |