Oursin lance gris

Cidaris cidaris

Secteur : Mer Méditerranée
Pays : France
Région : Var
Lieu : Carqueiranne
Site : Escampobariou
Profondeur : 30 m.
Date : 12 août 2007

Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	**Nom Latin**	**Nom en français et descriptif**
Embranchement	*Echinodermata*	Echinodermes : Symétrie radiale d'ordre cinq (chez les adultes). Squelette de plaques calcaires bien développé sous le derme. Présence d'un système aquifère auquel appartiennent les podia souvent visibles extérieurement.
Sous-embranchement	*Eleutherozoa*	Eleuthérozoaires : Echinodermes libres, mobiles, jamais fixés. Ils se déplacent avec la face orale tournée vers le substrat, ou couchés sur un côté.
Classe	*Echinoidea*	Echinides : Ce sont les oursins. Forme globuleuse ou hémisphérique, squelette qui porte des piquants mobiles, des pédicellaires et des pieds ambulacraires. Pouvoir de régénération limité.
Sous-classe	*Euechinoidea*	Euéchinides : Oursins plus ou moins sphériques, dits "oursins réguliers". Plaques ambulacraires composées. Bouche ventrale et anus dorsal.
Super-ordre	*Diadematacea*	Diadématacés
Ordre	*Cidaroida*	Cidaroïdes: Oursin-lances : piquants séparés, plaques ambulacraires simples.
Famille	*Cidaridae*	Cidaridés
Genre	*Cidaris*	
Espèce	*cidaris*	

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 24.09.2013