Table de corail *Acropora pulchra*



Secteur : Océdan indien
Pays : France
Région : Mayotte Sud
Lieu : Grande barrière de corail
Site : Passe Bouéni
Profondeur : 10 m.
Date : 20 mai 2010

Photo : Claude Cevey

Classification	*Nom Latin*	Nom Français et explications
Règne	*Animalia*	Animal
Embranchement	*Cnidaria*	Cnidaires : Organismes aquatiques (marins pour la plupart) libres ou fixés, carnivores, à symétrie radiaire, caractérisés par des cellules urticantes : les cnidocytes. Deux morphologies principales : le polype et la méduse. La larve est une planula.
Classe	*Anthozoa*	Anthozoaires : Cnidaires exclusivement marins, solitaires ou coloniaux, uniquement sous la forme polype (jamais de phase méduse dans le cycle développement).
Sous-classe	*Hexacorallia / Zoantharia*	Hexacoralliaires / Zoanthaires : Anthozoaires coloniaux ou solitaires, tentacules lisses, polypes à symétrie d'ordre 6.
Ordre	*Scleractinia*	Scléractiniaires / Madréporaires : Hexacoralliaires coloniaux (quelques espèces solitaires) produisant un exosquelette calcaire abritant de petits polypes.
Famille	*Acroporidae*	Acroporidés : Famille de cnidaires anthozoaires. La famille est apparue au Jurassique supérieur. Cette famille regroupe les plus importantes espèces batisseuse de récifs parmi les Scleractinia
Genre	*Acropora*	
Espèce	*pulchra*	