Poisson faucon à taches de rousseur

Paracirrhites forsteri

Secteur : Mer Rouge
Pays : Egypte
Région : Egypte sud
Lieu : Les Brothers

Site : Shab Sheer
Profondeur : m.
Date : 5 mai 2007
Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	*Nom latin*	*Nom en français et explications*
Règne	Animalia	Animal
Embranchement	Chordata	Cordé = Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés.
Sous-embranchement	Vertebrata	Vertébré = Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux
Super-classe	Osteichthyes	Osteichthyens : Vertébrés à squelette osseux.
Classe	Actinopterygii	Actinopterigiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées.
Sous-classe	Neopterygii teleostei	Néoptérygiens téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées
Super-ordre	Acanthopterygii	Acanthoptérygiens : Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens.
Ordre	Perciformes	Perciformes : Nageoires pelviennes très rapprochées des nageoires pectorales.
Sous-ordre	Percoidei	Percoïdes : Une ou deux nageoires dorsales dont les éléments antérieurs sont des épines aiguës. Nageoires pelviennes avec une épine, rayons mous.
Famille	Cirrhitidae	Cirrhitidés
Genre	Paracirrhites	
Espèce	fosteri	

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 18.10.2013