Telesto blanc

Carijoa riisei



Secteur : Mer des Caraïbes
Pays : Hollande
Région : Antilles néerlandaises
Lieu :St. Eustache
Profondeur : 40 m.
Date : 5 mai 2014

Photo : Claude Cevey

Classification	**Nom Latin**	**Nom Français et explications**
Règne	*Animalia*	Animal
Embranchement	*Cnidaria*	Cnidaires : Organismes aquatiques (marins pour la plupart) libres ou fixés, carnivores, à symétrie radiaire, caractérisés par des cellules urticantes : les cnidocytes. Deux morphologies principales : le polype et la méduse. La larve est une planula.
Classe	*Anthozoa*	Anthozoaires : Cnidaires exclusivement marins, solitaires ou coloniaux, uniquement sous la forme polype (jamais de phase méduse dans le cycle développement).
Sous-classe	*Octocorallia*	Octocoralliaires : Anthozoaires coloniaux ou solitaires, tentacules lisses, polypes à symétrie d'ordre 6.
Ordre	*Alcyonacea*	Alcyonaires : Octocorallaires dont les polypes sont enfouis dans un coenosarc épais plus ou moins calcifié. Polypes allongés qui restent accolés les uns aux autres en bouquets. Spicules fusiformes et épineux. Ce groupe renferme les alcyons (ou coraux mous), les gorgones, et les coraux vrais..
Famille	*Clavulariidae*	Clavulariidés : Appartiennent au sous-ordre Stolonifera. La plupart des espèces de cette famille sont peu développés et ne sont donc pas adaptés pour capturer leurs proies. Leur nourriture est photosynthétique, et en absorbant la matière organique dissoute dans l'eau.
Genre	*Carijoa*	
Espèce	*riisei*	

Créé par : Claude Cevey

Mise à jour le : 06.01.2015